

VÉCU ET PERCEPTION


**Qualité de vie, impact émotionnel et fardeau ressenti par
les personnes vivant avec un diabète et leurs proches,
dans l'étude DAWN 2TM**

S.-M. Consoll, Médecine des maladies métaboliques – Décembre 2013 – Vol. 7 – Suppl. 1

**Les hypoglycémies, un sujet de préoccupation majeur pour
les personnes atteintes de diabète et leur entourage :
résultats français de DAWN 2TM**


C. Colas, Médecine des maladies métaboliques – Décembre 2013 – Vol. 7 – Suppl. 1

- Étude menée **en collaboration** avec l'IDF, Le STENO, International Alliance Patients Organizations et Novo Nordisk
- **Étude psychosociale** pour apporter une vision globale des patients de l'entourage et des acteurs impliqués dans 17 Pays impliqués (vision globale à 360° du diabète)
- **Objectifs :**
 - Sensibiliser aux besoins (patients / entourage)
 - Faciliter le dialogue pour renforcer l'implication des patients (self management / prise en charge psychologique)
 - Partager les bonnes pratiques
- **5 thématiques** étudiées :
 - Qualité de vie : bien-être émotionnel et physique
 - L'entourage : nouvelles perspectives face au fardeau du diabète
 - Le patient : self management, implication et soutien
 - Education et information
 - Accès à des soins de qualité
 - Considérer la dimension d'efficience



Non TT : Sans traitement antidiabétique ; MF MIT / MF Ins : Membres de la famille de patients diabétiques traités par insuline ; MF MNIT / MF Non ins : Membres de la famille de patients diabétiques non traités par insuline

500 Personnes atteintes de diabète en France





Non TT : Sans traitement antidiabétique ; MF MIT / MF Ins : Membres de la famille de patients diabétiques traités par insuline ; MF MNIT / MF Non ins : Membres de la famille de patients diabétiques non traités par insuline

Qualité de vie, impact émotionnel et fardeau ressenti par les personnes vivant avec un diabète et leurs proches, dans l'étude DAWN2™

DiabèteAnalytics.fr

- **Pour les patients :** Vivre et gérer le diabète est une cause de détresse




- Dépressivité importante chez les patients vivant avec un diabète
- Pratiquement autant de détresse dans le diabète de type 2 que dans le diabète de type 1.

DT1 : personnes vivant avec un diabète de type 1 ; DT2 non TT : personnes vivant avec un diabète de type 2 non traité pharmacologiquement ; DT2 non insuline : personnes avec diabète de type 2 actuellement traitées par antidiabétique oral ou injectable, mais non traitées par insuline ; DT2 insuline : personnes vivant avec un diabète de type 2 traité par insuline. NS : différence non significative.

Résultats


Qualité de vie : bien-être émotionnel et physique

- **Pour les patients :** le diabète à un impact négatif sur leur vie



- Le diabète représente une menace pour la vie relationnelle et la vie de loisirs, chez les patients

- **Pour les patients :** décalage entre leurs attentes, quant à une médecine plus personnalisée et à une prise en compte de leur vécu de la maladie, et ce qui est mis en pratique dans la rencontre de soins par les professionnels de santé.




Résultats des personnes vivant avec un diabète et des professionnels de santé interrogés pour divers items du "Patient Assessment of Chronic Illness Care-DAWN Short Form" (PACIC-DSF).

Résultats


Qualité de vie : bien-être émotionnel et physique

- **Pour l'entourage** : le diabète génère inquiétude, détresse et la sensation de fardeau



MF insuline : membres de la famille d'un diabétique sous insuline ; MF non insuline : membres de la famille d'un diabétique non traité par insuline. NS : différence non significative.

- **Pour l'entourage :** le diabète à un impact négatif sur leur vie



- Le diabète représente une menace pour la vie relationnelle et la vie de loisirs, chez les patients comme chez leurs proches



Les hypoglycémies, un sujet de préoccupation majeur pour les personnes atteintes de diabète et leur entourage : résultats français de DAWN 2™

DiabèteAnalytics.fr

Résultats

Inquiétude face aux hypoglycémies


- **Pour les patients** : l'hypoglycémie est le symptôme majoritairement redouté



Résultats


Fréquence des hypoglycémies

- **Pour les patients :** au cours des 12 derniers mois, ressenti de symptômes d'hypoglycémie



- Fréquence moyenne d'épisodes sévères au cours des 12 derniers mois

- **Vécu par les patients**




- **Constaté par l'entourage**




Résultats

L'entourage et les épisodes glycémiques

- **Pour l'entourage** : l'hypoglycémie est le symptôme majoritairement redouté




- **Pour l'entourage** : Confiance en sa capacité à gérer des épisodes d'hypoglycémie



Résultats

L'entourage et les épisodes glycémiques

- **Pour l'entourage** : aide des membres de la famille lors des épisodes glycémiques



- **Dépressivité** importante chez les **patients** vivant avec un diabète, mais aussi dépressivité et fardeau lourd pour leur **entourage**.
- Pratiquement autant de **détresse** dans le diabète de type 2 que dans le diabète de type 1.
- Le diabète représente une **menace** pour la **vie relationnelle** et la **vie de loisirs**, chez les patients comme chez leurs proches.
- Bien que le passage à l'insuline soit vécu comme une sanction, les patients diabétiques sont globalement prêts à suivre les **recommandations** du professionnel de santé.
- Un décalage existe entre les **attentes** des patients, quant à une médecine plus personnalisée et à une prise en compte de leur vécu de la maladie, et ce qui est mis **en pratique** dans la rencontre de soins.
- L'**hypoglycémie** est le symptôme **majoritairement redouté** par les patients diabétiques et par leur entourage.
- L'entourage du patient diabétique est un **témoin privilégié du malaise hypoglycémique** de son conjoint, mais il n'a pas toujours eu la **formation** pour le reconnaître, pour y faire face et pour se sentir suffisamment sûr pour lui venir en aide.